

Fiche Pharmacologie

Antiparkinsoniens

- Maladie de **Parkinson** : dégénérescences des neurones dopaminergiques + déficience en dopamine
- Antiparkinsoniens anticholinergiques
- Antiparkinsoniens Dopaminergiques

Indications des antiparkinsoniens :

- Compenser le déficit en dopamine
- Limiter la destruction de la dopamine
- Limiter l'inconfort de la symptomatologie de la maladie de Parkinson

Les différentes classes thérapeutiques :

- Le précurseur de la dopamine : La lévodopa ou L-dopa : Traitement de référence de la maladie de Parkinson. Remplacer la perte de la dopamine
- Les agonistes dopaminergiques : les molécules se fixent sur les récepteurs cérébraux de la dopamine pour y reproduire les mêmes effets
- Les anticholinergiques : bloque l'action de l'acétylcholine

Situation à risque ou déconseillés :

- Troubles psychiatriques
- Phase aiguë de l'infarctus du myocarde

Les effets indésirables :

- Nausées, vomissements
- Hypotension orthostatique
- Sédation, somnolence
- Troubles du comportement : addiction aux jeux, achats compulsifs, hypersexualité
- Troubles psychiatriques : agitation, anxiété, délire, hallucinations visuelles et/ou auditives
- Pseudosyndrome malin des neuroleptiques à l'arrêt brutal du traitement